

TAKE HOME MESSAGES

1

• L'astenia è una condizione clinica varia, sia nella sua modalità di manifestazione, che nell'etiologia. Tra le possibili cause spesso siamo più sensibili all'ipotesi neoplastica, ma non dobbiamo trascurare altre possibili origini di astenia

2

• I Markers Tumorali, per le loro caratteristiche intrinseche di scarsa sensibilità e specificità, **NON** devono essere utilizzati per una diagnosi di screening delle patologie neoplastiche

3

• I Markers Tumorali, se usati correttamente, possono fornire importanti informazioni per valutare efficacia della terapia e il riconoscimento precoce delle recidive

4

• Non è più identificabile una sottopopolazione a rischio per HIV, ma in caso di sospetto clinico, vanno indagati eventuali comportamenti a rischio in tutta la popolazione

TAKE HOME MESSAGES

1

• Diarree acute: Negli episodi acuti diarroici la terapia reidratante è doverosa soprattutto per anziani e bambini. Non è necessario impostare una antibioticoterapia agli esordi di un episodio acuto diarroico poiché spesso si rivela un'infezione autolimitante

2

• Diarree acute: Evitare di prescrivere antidiarroici. Fornire adeguate indicazioni sulla corretta esecuzione degli esami sulle feci


3

• Diarree croniche: Eseguire un'adeguata visita clinica con esplorazione rettale e perianale. Utilizzo della calproctetina fecale come indice infiammatorio intestinale

4

• Diarree croniche: In presenza di proctorragia precoce richiesta di coloretoscopia. In assenza di proctorragia pensare a celiachia, intestino irritabile con diarrea da acidi biliari, coliti microscopiche

TAKE HOME MESSAGES



LA GIOVANE DONNA

TAKE HOME MESSAGES

1

- **Non richiedere routinariamente all'inizio della gravidanza sierologia HCV e VZV (CMV).**

2

- **Non fare test per trombofilia: in tp con CO (attendibili dopo 3 mesi dalla sospensione), in trombosi acuta, in gravidanza, in tp con eparina/TAO**

3

- **In assenza di fattori di rischio non si raccomanda l'esecuzione routinaria di esami ematochimici, tests di coagulazione, tests specifici per trombofilia prima di prescrivere o in corso di utilizzo di CO**

4

- **Una volta prescritto il contraccettivo adatto, rivalutare periodicamente i fattori di rischio rilevati in prima battuta**