



Trattamento	Inadeguata educazione terapeutica dell'assistito e della famiglia	Capacità dell'assistito/famiglia di seguire gli stili di vita prescritti e di monitorare PA e la terapia farmacologica	Educazione terapeutica: - ad ogni contatto specialistico - ad ogni modifica del piano di cura del MMG	Mancanza di tempo: - in ospedale - presso il MMG	% di ipertesi noti: - che seguono indicazioni per corretto stile di vita - con riduzione del BMI - che mostrano persistenza in trattamento farmacologico	-X% MMG; -Y% Gruppo	100%	75%
							100%	75%
							100%	75%
Follow-up	Insufficiente intervento proattivo guidato dal Governo clinico per l'ipertensione; insufficiente registrazione dei dati di monitoraggio	Aumento dei MMG che adottano interventi proattivi e che registrano con continuità i dati del Governo clinico per l'ipertensione	Governo clinico dei MMG con applicazione del PDT	- Mancanza di tempo - Inadeguata sistematicità nell'attività di rilevazione e registrazione	- % di MMG che adottano interventi proattivi (query periodica per chiamata, sistemi di reminder, sistemi di recupero dati da altre agenzie)  - % di MMG che registrano con continuità i dati del Governo clinico per l'ipertensione	-X% MMG; -Y% Gruppo	100%	50%
							100%	60%