

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano Tel 02 6765.1 welfare@pec.regione.lombardia.it

Segretario regionale AIOP Associazione Italiana Via Timavo, 24 20124 MILANO (Mi) Email: aioplombardia@cert.aconet.it

SEGRETARIO REGIONALE ARIS Via Mantova, 113 26100 CREMONA (CR) Email: arislombardia@arisassociazione.it

SEGRETARIO REGIONALE ANISAP via Martiri delle Foibe 1 20900 MONZA () Email: amministrazione@anisaplombardia.com

FEDERFARMA LOMBARDIA Viale Piceno, 18 20129 MILANO (MILANO) Email: lombardia@pec.federfarma.it

ASSOFARM LOMBARDIA C/O
CONSERVIZI MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129 ROZZANO (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

FROMCeO LOMBARDIA Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia Via Massenzio Masia 30 22100 COMO (CO) Email: presidenza.co@pec.omceo.it

Federazione Ordini dei Farmacisti della Lombardia Viale Piceno, 18 20129 MILANO (MI) Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

AI DIRETTORI GENERALI ASST AI DIRETTORI GENERALI ATS AI DIRETTORI GENERALI DEGLI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI IRCCS DI DIRITTO PRIVATO

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE AI SERVIZI FARMACEUTICI ATS, ASST, IRCCS E STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

e, p.c.

AIFA DIREZIONE GENERALE Via del Tritone, 181 187 ROMA () Email: protocollo@pec.aifa.gov.it

Oggetto: Nota Informativa Importante su MITOMICINA MEDAC

Si invia la nota informativa importante dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sulla MITOMICINA MEDAC 10 mg (AIC n. 044530044).

E' la revoca delle restrizioni sull'uso di preparati di mitomicina Medac per somministrazione endovenosa (revoca utilizzo filtro antiparticolato (5 µm) in caso di somministrazione endovenosa)

Nel 2022, durante un programma di stabilità in corso alcuni lotti hanno mostrato un risultato fuori specifica per quanto riguarda le particelle visibili.

Questi sono stati identificati come polimeri di mitomicina. In caso di somministrazione intravescicale sono previsti effetti negativi sui pazienti.

Le suddette restrizioni all'uso erano basate su questo possibile rischio per la sicurezza dei pazienti solo in caso di uso endovenoso. Il rischio di eventi tromboembolici poteva evitato efficacemente utilizzando un filtro antiparticolato appropriato (dimensione dei pori di 5 µm).

Adattando il processo di fabbricazione, il rischio di formazione di particelle visibili è stato eliminato.

Distinti Saluti

II Dirigente IDA FORTINO

NII Mitomicina 18.09.2023.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.